

# Analiza Wielowymiarowa

## Analiza związku między zmiennymi

Paweł Strawiński

Zajęcia 4  
16 listopada 2023

# Plan zajęć

## 1 Analiza korelacji

- Korelacja
- Miary zależności dwóch cech

## 2 Analiza różnicowania

- Jednoczynnikowa analiza wariancji
- Wieloczynnikowa analiza wariancji

# Definicja korelacji

- Według definicji słownikowej korelacja oznacza współwystępowanie
- Za Encyklopedią Statystyki (red. Sadowski (1976))  
*Korelacja określa wzajemne powiązania pomiędzy wybranymi zmiennymi. Charakteryzując korelację podajemy dwa czynniki: kierunek oraz siłę. Wyrazem liczbowym korelacji jest współczynnik korelacji*
- Korelacja może być traktowana jako miara wzajemnego „dopasowania” zmiennych losowych
- Analiza korelacji jest metodą wykrywania występowania statystycznej zależności między zmiennymi

# Współczynnik korelacji

- Współczynnik korelacji jest unormowaną miarą kowariancji (wspólnej wariancji) zmiennych losowych
- Ogólny wzór na współczynnik korelacji

$$\text{corr}(X, Y) = \rho_{XY} = \frac{\text{COV}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}X} \sqrt{\text{Var}Y}}$$

- Wzór ma sens wyłącznie dla zmiennych losowych o skończonych dwóch pierwszych momentach, czyli zmiennych losowych, których rozkłady są stacjonarne w sensie słabym

# Własności współczynnika korelacji

- Wartości współczynnika korelacji są ograniczone

$$-1 \leq \rho_{XY} \leq 1$$

- Wartość współczynnika korelacji jest niezmiennicza względem przekształcenia afinicznego zmiennych losowych

$$\rho_{XY} = \rho_{(a+bX)(\alpha+\beta Y)}$$

- Wartość bezwzględna współczynnika korelacji wynosi 1, gdy związek między zmiennymi losowymi jest liniowy

# Test Chi2 Pearsona

- Może być wykorzystany do
  - sprawdzania, czy rozkład empiryczny zmiennej losowej jest zgodny z rozkładem teoretycznym
  - sprawdzenia, czy rozkłady zmiennych losowych przedstawione w formie tablicy kontyngencji (tablicy krzyżowej) są niezależne
- Statystyka testowa ma postać

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J \frac{n_{ij} - E_{n_{ij}}}{E_{n_{ij}}} \sim \chi^2((I-1)(J-1))$$

gdzie:

$i$  jest liczbą wierszy w tabeli krzyżowej

$j$  jest liczbą kolumn w tabeli krzyżowej

$n_{ij}$  liczbą obserwacji w komórce  $ij$

$E_{n_{ij}}$  oczekiwaną liczbą obserwacji w komórce  $ij$

# Współczynnik V-Cramera

- Statystyka V-Cramera jest unormowaną wersją statystyki  $\chi^2$
- Statystyka testowa ma postać

$$V = \sqrt{\frac{\chi^2}{n} \frac{1}{\min\{I-1, J-1\}}}$$

- Dla tablicy o wymiarach 2X2, stosowany jest inny wzór i wówczas statystyka testowa przyjmuje wartości od -1 do 1
- Dla tablicy o większych wymiarach statystyka testowa przyjmuje wartości od 0 do 1

# Współczynnik korelacji Pearsona

- Służy do wyznaczania siły współzależności zmiennych o rozkładzie ciągłym
- Niech  $\mathbb{X}$  oraz  $\mathbb{Y}$  będą zmiennymi losowymi o rozkładzie ciągłym
- Niech  $\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$ ,  $\bar{y} = \frac{\sum_{i=1}^n y_i}{n}$
- Współczynnik korelacji dany jest wówczas wzorem

$$r_{XY} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$$

- Jego wartość informuje o sile i kierunku zależności liniowej
- Dla zmiennych o rozkładzie normalnym jest zgodnym estymatorem współczynnika korelacji
- Jego wartości mogą być zniekształcone przez występowanie obserwacji o wartościach skrajnych

# Współczynnik korelacji Kendalla

- O każdej parze  $(x_i, y_i)$ ,  $(x_j, y_j)$  mówimy, że jest zgodna, jeżeli

$$(x_i - x_j)(y_i - y_j) > 0$$

- W przeciwnym przypadku mówimy, że jest niezgodna
- Niech
  - P będzie liczbą par zgodnych
  - Q będzie liczbą par niezgodnych
  - N będzie liczebnością próby
- Wówczas statystyka testowa ma postać

$$\tau = 2 \frac{P - Q}{N(N - 1)} \sim N(0, 1)$$

# Współczynnik korelacji Kendalla

- Mierzy siłę zależności monotonicznej między zmiennymi losowymi
- Jest współczynnikiem nieparametrycznym, jego wartość nie zależy od rozkładu zmiennych losowych
- Do obliczenia jego wartości wykorzystywane są rangi obserwacji, dzięki czemu wartości współczynnika są odporne na występowanie obserwacji odstających

# Współczynnik korelacji rang Spearmana

- Jest to współczynnik korelacji Pearsona obliczony dla rang wartości zmiennych losowych
- Mierzy siłę zależności monotonicznej
- Jest miarą siły związku liniowego i wyłącznie do takich związków powinien być stosowany

# Analiza różnicowania

- Analiza różnicowania, w języku angielskim *Analysis of variance (ANOVA)* to ogólna nazwa dla grupy modeli statystycznych używanych do analizy różnic w średnich wartościach cechy pomiędzy grupami
- Różnicowanie zmiennej jest dzielone na składowe, które można przypisać różnym czynnikom
- Historycznie została zaproponowana przez R. A. Fishera w celu analizy danych eksperymentalnych

# Równość analizy wariancji

- Analiza wariancji oparta jest na równości analizy wariancji

$$TSS = ESS + RSS$$

- Niech:  $N$  jest liczebnością próby,  $J$  jest liczbą wartości w przypadku zmiennej nominalnej lub przedziałowej, dla zmiennej ciągłej  $J = 1$ 
  - TSS jest całkowitą sumą kwadratów, ma  $N - 1$  stopni swobody.
  - ESS jest wyjaśnioną sumą kwadratów, ma  $J - 1$  stopni swobody.
  - RSS jest resztową sumą kwadratów, ma  $N - J$  stopni swobody.

# Jednoczynnikowa analiza wariancji (1)

- Jednoczynnikowa analiza wariancji jest testem statystycznym równości średnich w grupach
- Może być traktowana jako uogólnienie testu t na większą liczbę grup
- Wielokrotne przeprowadzenie testu t powodowałoby powstanie obciążenia Lovella
- Założenia analizy
  - cecha w każdej grupie ma rozkład normalny
  - grupy są niezależne
  - grupy mają cechy losowych prób prostych
  - wariancje w grupach są równe

## Jednoczynnikowa analiza wariancji (2)

- Porównywana jest wariancja wewnątrzgrupowa i międzygrupowa
- Statystyka służąca do weryfikacji hipotezy o równości średnich jest ilorazem wariancji wewnątrzgrupowej (wyjaśnionej) i międzygrupowej (resztowej)

$$F = \frac{ESS}{RSS} \sim F(J, N - J)$$

- Nieparametrycznym odpowiednikiem jednoczynnikowej analizy wariancji jest test Kruskala-Wallisa

# Wieloczynnikowa analiza wariancji

- Celem wieloczynnikowej analizy wariancji jest zbadanie wpływu więcej niż jednego czynnika na całkowite zróżnicowanie
- Dodatkowo w analizie uwzględniane są efekty interakcji między czynnikami
- Hipotezą zerową jest nadal brak zróżnicowania średnich
- Wzory komplikują się, wymuszają obliczenie sum kwadratów związanych z każdym czynnikiem i każdą interakcją